

LA VACCINATION

UNE BONNE PROTECTION

En faisant vacciner votre enfant, vous lui offrez la meilleure protection contre certaines maladies graves.

Comment agissent les vaccins ?

Les vaccins amènent nos cellules de défense à fabriquer des substances qu'on appelle anticorps. Il s'agit d'une réaction protectrice tout à fait naturelle. Grâce à ces anticorps, la personne vaccinée devient protégée contre les maladies causées par les véritables microbes.



Quand devrais-je faire vacciner mon enfant ?

Le premier vaccin est donné dès l'âge de 2 mois afin de protéger votre enfant rapidement. Plusieurs doses de vaccin sont parfois nécessaires pour établir une protection et garder des anticorps protecteurs en quantité suffisante.

Votre enfant devrait recevoir :

Entre 2 et 23 mois			Entre 4 et 16 ans		
Le vaccin DCaT-Polio-Hib	Le vaccin conjugué contre le pneumocoque	Le vaccin RRO	Le vaccin DCaT-Polio	Le vaccin Hépatite B	Le vaccin dCaT
À 2 mois					
À 4 mois	À 2 mois	À 12 mois	Entre 4 et 6 ans	En 4 ^e année du primaire	Entre 14 et 16 ans Par la suite, rappel de d ₂ T ₃ tous les 10 ans
À 6 mois	À 4 mois	À 18 mois			
À 18 mois	À 12 mois				
Ce vaccin protège contre:	Ce vaccin protège contre:	Ce vaccin protège contre:	Ce vaccin protège contre:	Ce vaccin protège contre:	Ce vaccin protège contre:
<ul style="list-style-type: none"> la diphtérie (D) la coqueluche (Ca) le tétanos (T) la poliomyélite (Polio) les infections graves à <i>Haemophilus influenzae</i> de type b (Hib) 	<ul style="list-style-type: none"> les infections graves à pneumocoque 	<ul style="list-style-type: none"> la rougeole (R) la rubéole (R) les oreillons (O) 	<ul style="list-style-type: none"> la diphtérie (D) la coqueluche (Ca) le tétanos (T) la poliomyélite (Polio) 	<ul style="list-style-type: none"> l'hépatite B 	<ul style="list-style-type: none"> la diphtérie (d) la coqueluche (Ca) le tétanos (T)
	Le vaccin Méningocoque	Le vaccin Varicelle			
	À 12 mois	À 12 mois			
	Ce vaccin protège contre:	Ce vaccin protège contre:			
	<ul style="list-style-type: none"> l'infection à méningocoque de sérogroupe C 	<ul style="list-style-type: none"> la varicelle 			
Le vaccin contre l'Influenza (en saison d'influenza)					
Entre 6 et 23 mois					

NOVEMBRE 2005

05-278-20

Pour mieux protéger votre enfant, n'oubliez aucun vaccin et faites-le vacciner aux âges recommandés. C'est à vous de prendre rendez-vous au CLSC ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant.